

〔使用上の注意〕

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる
ない場合は服用を中止し、こ
の製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してく
ださい。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後
などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)
1回1瓶(100mL)
1日1回服用してください。
●15歳未満は服用しないでくだ
さい。
●用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:瓶
金属:キャップ

22A2

SANRIKISO Z3000II

滋養強壮・肉体疲労時などの栄養補給

サンリキソZ3000II

タウリン
3000mg

BCAA配合
バリン
ロイシン
イソロイシン

牛黄

ローヤルゼリー

アミノ酸配合

100mL

第3類医薬品

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中 登録品目番号24-467

ゴオウ浸出液5mg(ゴオウ0.5mgに相当)、
ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー
50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボ
フラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピ
リドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド
30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等
量混合物200mg、カルニチン塩化物100mg、
L-バリン60mg、L-ロイシン120mg、L-イソ
ロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩60mg
(アルコール0.2mL以下)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ス
クラロース、DL-リンゴ酸、カラメル、安息
香酸Na、パラベン、ポリリン酸Na、pH調
整剤、エタノール、グリセリン、香料を含有
する。

- 本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色
になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生
じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

1瓶(100mL)中74.6kcal

¥300+税

製造販売元 株式会社廣 貫 堂

富山市梅沢町2丁目9-1
(お客様相談窓口)電話076-424-2259

使用
期限

製造
記号

