

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

# 鎮咳去痰薬 新コフジスシロップ<sup>®</sup>

「せき」はのどや気管支の炎症などによって起こります。「せき」が頻発したり、長く続くとのどを痛めたり、声がかれたりします。さらにはそれだけでなく、睡眠をさまたげ、体力を消耗させ、ひいては病気に対する抵抗力を低下させます。

新コフジスシロップは「せき」の中枢に作用する成分、気管支を拡張させて「せき」をしめる成分、「たん」をうすめてはき出しやすくする成分などを配合していますので「せき」や「たん」にすぐれた効果を期待できます。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

\*12歳未満の小児。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後・乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

#### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### 5. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚(ふ)	発疹、発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

#### 4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【効能・効果】**

せき、たん

**【用法・用量】**

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び必要に応じて、就寝前に服用してください。  
 また、場合によって1日5~6回まで服用しても支障ありませんが、その場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量
15歳以上	10 mL
12歳以上 15歳未満	6.5 mL
12歳未満	服用しないでください

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量と作用】**

1日量(60mL)中

成 分	分量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	せき中枢に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
カフェイン水和物	90 mg	抗ヒスタミン剤による眠気を防止します。
カンゾウエキス (原生葉換算量:560 mg)	140 mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをうすめてはき出しやすくなります。

添加物として、白糖、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、プロピレンゲリコール、ポリリン酸Na、リン酸二水素Na、メタリン酸Na、安息香酸Na、パラベン、エタノール、赤色2号、香料を含有します。

**〈成分・分量に関連する注意〉**

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。効果に変わりはありません。よく振って服用してください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 服用のつど、瓶の口をよく拭き、フタをしっかりとしめておいてください。
- (6) いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7) 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (8) 気温が低い時や甘味成分のためキャップが開けにくくなることがあります。このような時は、一度キャップ部を温湯に浸すなどして、あたためてから開けてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は  
下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

**福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL:0748-52-2323

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824