

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 〈痔疾用薬〉

# ちの痛み・はれ・かゆみに

第②類医薬品

# フェロテナスぢ軟膏A

フェロテナスぢ軟膏Aは、痔の治療に有効なヒドロコルチゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸など7種の有効成分を配合した痔疾用軟膏で痔の痛み、はれ、かゆみ、出血の不快な4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)患部が化膿している人。

#### 2. 長期連用しないでください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### 3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〔効能・効果〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

## [用法・用量]

適量をとり肛門部に塗布してください。なお、1日3回まで使用できます。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。
- (3) 定められた用法・用量を守ってください。

## [成分・分量]

100g中

はたらき	成 分	分 量
痔の痛みとかゆみをおさえます。	リドカイン	3.0g
痔のはれと出血をおさえます。	ヒトロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
細菌の感染をおさえます。	クロルヘキシジン塩酸塩	0.5g
痔の炎症とかゆみをおさえます。	ジフェンヒドラミン	0.5g
傷の治りをたすけ、組織を修復します。	アラントイൻ	1.0g
痔の炎症をおさえます。	グリチルレチン酸	0.3g
血液の流れを良くし、うっ血をおさえます。	トコフェロール酢酸エステル	1.0g

添加物として白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ミリスチン酸オクチルドデシル、2-エチルヘキサン酸セチル、モノステアリン酸グリセリン、BHT、ユーカリ油を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるので防ぐため)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。

## 痔治療のポイント

1. トイレでは無理にいきます  
3分以内に心がけましょう。  
排便後はぬるま湯で洗うなど、肛門を清潔にしましょう。  
ペーパーで強くこすらないようにしましょう。
2. 便通をよくするために規則正しい生活と運動をしましょう。  
野菜や繊維質を多くとりお酒や刺激物をひかえましょう。
3. 患部を清潔にするため毎日の入浴を心がけましょう。  
入浴中は、おしりに負担のないリラックスした姿勢で。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-2100 (代表) 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>