

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ヨノールA軟膏

第2類医薬品

化膿性皮膚疾患治療薬

特 徴

ヨノールA軟膏は、化膿菌に効果を有するサルファ剤のスルファジアジンに抗炎症作用を有するグリチルレチン酸、局所麻酔作用を有するジブカイン塩酸塩を配合した化膿性皮膚疾患の治療薬です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分・分量〕(100g中)

成 分	分 量	は た ら き
スルファジアジン	5.0g	広範囲の殺菌作用により化膿を治します。
グリチルレチン酸	0.3g	抗炎症・抗アレルギー作用により炎症やかゆみをしずめます。
ジブカイン塩酸塩	0.1g	局所麻酔作用により痛みをおさえます。

添加物として、流動パラフィン、セタノール、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステル、ラウリル硫酸Na、その他2成分を含有する。

〔効能・効果〕

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

〔用法・用量〕

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3)外用にのみ使用して下さい。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

この薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

電話：06-6351-2100(代表)

(午前9時から午後5時まで 土、日、祝日を除く)

発売元

奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号
<http://www.okudaseiyaku.co.jp>

製造販売元

日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2