



ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

指定医薬部外品

## のどのあれ、痛み、口の中の殺菌・口臭の除去に

# ノドニトローチ



咽・喉頭炎などの感染症は、過労、睡眠不足などにより体の抵抗力が弱ったときに口や鼻から侵入した細菌によってひきおこされ、のどの炎症や痛み、はれといった症状が生じます。

また最近では空気の乾燥や排気ガスなどの影響で、のどに炎症が生じ、のどのあれ、声がれなどの症状に悩まる方が増えてきています。

ノドニトローチはのどの痛み、はれをおさえ、不快感を解消します。さらに、殺菌・消毒作用により、細菌の侵入をふせぎます。

口中でかまづにゆっくり溶かすトローチ剤ですので、長時間作用します。

使用しやすい穴あきトローチです。



### ⚠ [使用上の注意]

#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発 痒・発 赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

#### [成分] 1日量 (6個) 中

セチルピリジニウム塩化物水和物 ..... 6mg

口腔内の殺菌・消毒作用により細菌の侵入をふせぎます。

グリチルリチン酸二カリウム ..... 15mg

のどの炎症を抑え、痛みやはれを鎮めます。

キキョウエキス ..... 120mg

(キキョウとして480mg)

のどの痛み、不快感をおさえる生薬成分です。

添加物として、白糖、ブドウ糖、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸マグネシウム、銅クロロフィリンナトリウム、香料、l-メントール、バニリン、エチルバニリンを含有します。

(裏面もお読みください)

## [効能・効果]

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ


## [用法・用量]

次の1回量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまづにゆっくり溶かしてください。


年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1個	6回
5歳以上15歳未満	1個	3回
5歳未満の乳幼児	使用しないこと	

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) かみ碎いたり、のみ込んだりしないでください。
- (4) トローチ剤の取り出し方  
右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



〈PTPシートの取り出し図〉



## [保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 本剤は使用期限表示品です。箱に表示した期限内に使用してください。また一度内袋（アルミ袋）を開封した後は、使用期限内であっても6ヵ月以内に使用してください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社

(09.5.改訂)